Manejo de Plantas Daninhas em Mudas Pré Brotadas

Carlos Daniel Berro Filho – Coordenador Corporativo de Desenvolvimento Técnico

Junho, 2015

Unidades

Núcleo de Produção de Mudas

Quais as principais diferenças ?

1. Maior sensibilidade a herbicidas

- Selecionar produtos com maior foco em seletividade
- Redobrar cuidados em variedades mais susceptíveis

2. Não é possível fazer a aplicação em pós-plantio em pré-total da cana

- Produtos muitas vezes usados em pré-total da cana em pós-plantio devido sua menor seletividade tendem a perder espaço
- Monitoramento da área para intervenção em pós, utilizando produtos seletivos
- Maior dependência do bom manejo das PD antecedente ao plantio

3. Fechamento mais rápido do canavial

- Possibilidade de se aproveitar mais produtos de residual mais curtos

- **Ponto chave: Definição do local de plantio do viveiro, PLANEJAMENTO**

- 1. Evitar locais com elevada infestação de plantas daninhas**
- 2. Evitar locais com presença de ervas como mamona, merremia, mucuna, colonião, grama-seda e tiririca**
- 3. Utilizar melhores ambientes dentro da região a se formar o viveiro, visando rápido fechamento**
- 4. Buscar locais com possibilidade de irrigação, para rápido pegamento e fechamento**

• Dessecação e Desinfestação

- 1. Dessecação: Glifosato + parceiros (Metsulfuron, Saflufenacil, etc) visando uma boa eliminação do canavial anterior e das PD**
- 2. Desinfestação: como foi feita uma definição da área prévia com critério, não será necessária utilização de produtos muito agressivos para desinfestação, buscar ir de Tebuthiuron, S-metalochlor, Diuron, Ametrina, Metsulfuron, Atrazina**
 - Interessante para esta aplicação fazê-la o mais próximo possível do plantio, para que o residual dos produtos possa ser aproveitado até o quebra-lombo
- 3. Desinfestação: eu já comecei errado e selecionei uma área com histórico de ervas de difícil controle**
 - Neste caso distanciar mais esta aplicação de sua data do plantio, visando fugir de eventuais fitotoxidades no MPB. Para estes ir de Isoxaflutole para colonião, Amicarbazone para 3M's, Sulfentrazone para tiririca, Clomazone para sorgos, etc.
 - Para esta situação pode ser interessante após a desinfestação, fazer uma aplicação pré-plantio com moléculas citadas no item 2

- **Pós plantio**

- 1. A situação está totalmente sob controle, a área tem bom histórico, a dessecação e desinfestação foram muito bem feitas e o plantio foi feito em Jan/Fev/Mar**

- Neste caso não aplicar nada, deixar o residual da desinfestação manter limpo o canavial e aguardar o fechamento do canavial, que para MPB é mais rápido, fazendo intervenções em pós, caso necessário com a mistura Metribuzin+Mesotrione

- 2. A situação está parcialmente sob controle. Não foi possível fazer uma boa dessecação e desinfestação, ou se feito a área já teve histórico de ervas de difícil controle, ou mesmo se o histórico é tranquilo e a dessecação e desinfestação ocorreram bem, mas o plantio foi em Abr/Mai**

- Nesta situação, logo após o plantio das mudas fazer uma aplicação de produtos de com efeito pré-emergente seletivos a cana, ir de misturas com Tebuthiuron, Metribuzin, S-metolachlor, Atrazina.

- **Quebra-lombo**

- 1. Plantio de Jan/Fev/Mar com QL em Mar/Abr/Mai**

- No quebra-lombo com jato dirigido, ir de misturas com Tebuthiuron mais parceiro, podendo ser: Diuron, Ametrina, S-metalochlor, Metribuzin, Atrazina e Mesotrione(pós)

- 2. Plantio de Abr/Mai com QL em Out/Nov**

- Ir de misturas com: Diuron, Ametrina, S-metalochlor, Tebuthiuron, Metribuzin, Atrazina e Mesotrione(pós).

PERFILHAMENTO

- **Socas**

- 1. Manejo padrão, similar as áreas de cana convencional**

- Não só por isto devemos deixar de nos preocupar com a seletividade, ainda mais quando falamos em socas de um plantio de MPB de alta produtividade

UNIDADE PEDRO AFONSO

- Plantio MPB “caseiro” Fevereiro/14
- Histórico de ervas menos agressivas
- 4 Litros de Glifosato na dessecação
- 2 Litros de Tebuthiuron na desinfestação, encostada no plantio
- Monitoramento para eventuais pós até o QL
- Não QL e fechou no limpo

UNIDADE SANTA JULIANA

- **Plantio PlenePB Syngenta Novembro/13**
- **Histórico de ervas intermediário**
- **4 Litros de Glifosato na dessecação**
- **3 Litros S-metolachlor + 4 Litros Ametrina (pré-plto)**
- **0,25 Litros Mesotrione + 4 Litros Ametrina (pós-plto)**
- **Não QL e fechou no limpo**

UNIDADE SANTA JULIANA

- **Plantio Plene Envolve Syngenta Maio/14**
- **Histórico de ervas intermediário**
- **4 Litros de Glifosato na dessecação**
- **3 Litros S-metolachlor + 1,8 Litros Tebuthiuron (pré-plto)**
- **3 Litros Diuron + 3 Litros Ametrina (QL)**

UNIDADE MOEMA

- Plantio AgMusa Basf Maio/13
- Histórico de ervas intermediário
- 4 Litros de Glifosato na dessecação
- 1,8 Litros Tebuthiuron (pré-plto)
- 3,5 Litros Metribuzin (pós-plto)

UNIDADE Santa Juliana

- **Plantio AgMusa Basf Dez/14**
- **Histórico de ervas intermediário**
- **4 Litros de Glifosato na dessecação + 0,1 Provence**
- **1,8 Litros Tebuthiuron + 3,5 Litros Metribuzin (linha)**
- **3 Litros Trifuralina Gold + Crotalária na entrelinha (incorporados)**

- **Conclusões**

- 1. Ponto chave: maior sensibilidade da planta quando comparada ao plantio convencional de cana**
- 2. Maior sensibilidade = Uso de produtos mais seletivos**
- 3. Uso de produtos mais seletivos = Manejo mais assertivo e planejado, permitindo abrir mão de moléculas de elevado controle do mato mas de menor seletividade**
- 4. Fitotoxicidade em viveiros não somente quebra a produtividade do canavial, como impacta diretamente na viabilidade e vigor de nascimento das gemas e conseqüentemente no vigor do canavial seguinte**